

实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊
中文妇产科类核心期刊
中国科技论文统计源中国科技核心期刊
中国科学引文数据库来源期刊
美国《化学文摘》数据库收录

第12期
2022年第38卷

SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

琪宁 黄体酮软胶囊
Progesterone Soft Capsules

广告 国药准字H20031099
浙药广审(文)第240929-00829号
本广告仅供医学药学专业人士阅读

可口服 可阴道给药

对口服剂量过大可能引起的头晕, 可阴道给药

调经 助孕 助保胎



【用法用量】可经口服或阴道给药。

在任何情况下,都应严格按照医生的处方用药。平均而言,对于黄体酮缺乏症,每日剂量为200-300mg。

一次或分两次服用,即早晨100mg,晚上睡觉前100mg或200mg。

可根据适应症和疗效调节治疗剂量和周期,特别是在帮助妊娠治疗时,医生可将每日剂量提高至600mg,分三次给药。

在任何情况下,无论是否口服还是阴道给药,每次的剂量均不得超过200mg。

如果感觉该药物疗效太强或太弱,请向你的医生或药师说明情况。根据具体情况,可以采用连续性处方给药治疗法,或者每个月的数天服用给药治疗法,并与雌激素同时服用。

服药方式可采用口服和阴道给药,具体方法由医生根据你的具体情况而定;如果医生建议口服给药,用温水吞服,最好远离进餐时间,一次或分三次服用,具体按照医生的处方服用。

如果医生建议阴道用药,请把胶囊塞到阴道深处。用药时间的长短由医生根据你的具体病况决定。

根据适应症的情况和疗效,医生可以再调整用药剂量。如果已经超过医生规定的服药期限,请立即向医生说明情况。

若遗漏服用该药物,请勿为补偿忘记服用药物的剂量而加倍服用该药物,或遵医嘱。



已过仿制药一致性评价

招商热线 18969068267 (姚经理)

【适应症】

用于治疗由黄体酮缺乏引起的机能障碍:

排卵机能障碍引起的月经失调;痛经及经前期综合征;出血(由纤维瘤等所致);

绝经前紊乱;绝经(用于补充雌激素治疗)。本品也助于妊娠。


在使用黄体酮进行治疗的所有适应症时,因黄体酮能引起诸如嗜睡、头晕目眩等不良反应,可以用阴道给药代替口服给药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

针对上千名妇女患者的多项流行性病学研究结果表明胎儿畸形与服用黄体酮无任何必然联系。孕妇和哺乳妇女在服用任何药物之前,均需征求医师和药师的意见。

【不良反应】【禁忌】【注意事项】详见说明书

ISSN 1003-6946





实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



期刊电子版

微信公众号

月刊 1985 年 10 月创刊 第 38 卷 第 12 期(卷终) 2022 年 12 月 15 日出版

主管:四川省卫生健康委员会
主办:四川省医疗卫生服务指导中心
协办:四川省医学会
四川省医师协会
四川省护理学会
出版单位:实用妇产科杂志编辑部
地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街
2 号附 3 号
邮政编码:610041
电话: (028) 86131263
E-mail: jpog1985@163.com
本刊投稿网址: http://jpog.sma.org.cn
版权归实用妇产科杂志编辑部所有
主编:赵霞
编辑部主任:王刚
编辑部副主任:肖尧
国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946
国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R
印刷:四川新华印刷有限责任公司
国内发行:四川省报刊发行局
海外总发行:
中国国际图书贸易集团有限公司
(北京 399 邮箱, 100048)
国外发行代号:M3279
订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44
定价:每册 20 元 全年 240 元
广告发布登记编号:川广登字[2020]0007号

本刊刊出的所有文章不代表
本刊编委会和编辑部的观点
除非特别声明

本期执行编委: 漆洪波
本期责任编辑: 贺鲁宁

目 次

专题讨论

再谈妊娠期常见肝脏疾病的相关问题专题讨论	
妊娠期肝脏的生理性改变及生化指标解读	张勤建, 颜建英 881
妊娠剧吐合并肝功能损害的诊治	文燕青, 漆洪波 885
妊娠期肝内胆汁淤积症诊治的要点篇——基于循证证据的思考	
.....	邢爱耘 888
乙型病毒性肝炎母婴阻断策略的选择	朱慧, 胡娅莉 892
妊娠合并自身免疫性肝病的孕期管理	徐国才, 张建平 894
肝硬化、肝移植患者妊娠指征及孕期管理	
.....	张瑜亮, 张丽姿, 陈兢思, 等 897
HELLP 综合征的处理	袁琳, 刘兴会 899

临床病案讨论

血压升高伴肾功能不全 2 ⁺ 年, 孕 30 ⁺ 周脐血流异常 30 分钟	
.....	李健鑫, 陈真 902

指南解读与专家共识

从不同指南解析妊娠期高血压疾病的诊治筛防	
.....	晁冰迪, 谢禄美, 漆洪波, 等 906
英国皇家妇产科医师学会《妊娠期肝内胆汁淤积症(2022)》指南要点	
解读	曾帅, 刘倚君, 刘兴会 909

综述与讲座

雷帕霉素靶蛋白在卵泡发育和昼夜节律中的研究	苏 婵,罗 伟,张秀娟,等	914
子宫腺肌病相关性不孕的发病机制及治疗进展	叶荣慧,何雪梅,邓冰冰,等	918

论著与临床

XRCC4 在输卵管高级别浆液性腺癌中的表达及临床意义	王一然,王 平	923
卵母细胞滑面内质网聚集对卵胞浆内单精子显微注射周期妊娠和新生儿结局的影响	张旖旎,汪 萌,高丽敏,等	928
合并胎儿窘迫的早期早产危险因素及围产儿结局分析	季小红,吕 燕,丁虹娟,等	933
子宫颈机能不全行子宫颈环扎术患者发病的相关因素分析	韩 玉,杨海润	938
NLRP5 和 Caspase-4 在胎膜早破合并组织学绒毛膜羊膜炎患者中的表达及临床意义	郭一恒,朱锦明,彭凤云,等	943
宫腔镜 7Fr 冷刀在绝经后子宫内膜息肉中的临床应用价值	雷 燕,杜 欣,邢 琦,等	948
凶险性前置胎盘从孕 28 周到分娩前转归的高危因素及磁共振成像分析	罗东琼,罗 丹,李 鑫,等	953

短篇报道

中央型前置胎盘合并产后非典型性溶血尿毒症 1 例	张 林,单 丹,胡雅毅	958
--------------------------	-------------	-----

《实用妇产科杂志》多篇论文入选中国知网学术精要数据库“高影响力论文”	905
发表学术论文“五不准”	922
欢迎订阅《实用妇产科杂志》	960

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly
Started Publication on October 1985
Volume 38, Number 12
December 15, 2022

Responsible Institution

Health Commission of Sichuan Province
Sponsor

Sichuan Medical and Health Service
Guidance Center
Co-organized

Sichuan Medical Association
Sichuan Medical Doctor Association
Nursing Association of Sichuan Province

Editor-in-Chief

Zhao Xia(赵霞)
Managing Director

Wang Gang(王刚)

Deputy Managing Director

Xiao Yao(肖尧)

Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

Publishing

Editorial Department of Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology
No.2-3, Yulin South Street, Chengdu
Sichuan 610041, China
Tel(Fax) : (028)86131263
E-mail : jpog1985@163.com
http://jpog.sma.org.cn

Overseas Distributor

China International Book Trading
Corporation
(P.O.Box 399, Beijing, China)
Code No.M3279

ISSN 1003-6946
CN 51-1145/R

**Copyright© 2022 by the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.**

All articles published represent the opinions
of the authors, do not reflect the official
policy of the Editorial Board of the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology or the
Editorial Department, unless this is clearly
specified.

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

The Expression of XRCC4 in Fallopian Tube High-Grade Serous Adenocarcinoma and its Clinical Significance	WANG Yiran, WANG Ping	923
Effect of Oocytes with Smooth Endoplasmic Reticulum Aggregates on the Pregnancy and Neonatal Outcomes in ICSI Cycles	ZHANG Yini, WANG Meng, GAO Limin, et al	928
Risk Factors and Perinatal Outcomes of Fetal Distress in Early Preterm Birth	JI Xiaohong, LV Yan, DING Hongjuan, et al	933
Risk Factors for Cervical Insufficiency in Patients Performed Cervical Cerclage	HAN Yu, YANG Hailan	938
Expression and Significance of NLRC5 in Patients with Premature Rupture of Fetal Membranes and Histologic Chorioamnionitis	GUO Yiheng, ZHU Jinming, PENG Fengyun, et al	943
Clinical Value of Hysteroscopic 7Fr Cold Knife in Postmenopausal Endometrial Polyp	LEI Yan, DU Xin, XING Qi, et al	948
The High Risk Factor of Pernicious Placenta Previa from the 28-week Pregnancy to Delivery: a Retrospective Nested Case-Control Study	LUO Dongqiong, LUO Dan, LI Xin, et al	953

辛复宁®
外

人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

80万IU市售剂量

人干扰素α2b阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名：人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

曾用名：重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音：Ren Ganraosu α2b Yindao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份：以人干扰素α2b为原料，经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅 料：甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水枸橼酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性 状】 本品为白色硬胶囊，内容物为白色粗粉末。

【适 应 症】 用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规 格】 80万IU/粒。

【用法用量】 将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】 极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛，停药后自行消失。

【禁 忌】 对本品成份过敏者禁用。

【注意事 项】 用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕 妇 及 哺 乳 期 妇 女 用 药】 孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿 童 用 药】 儿童禁用。

【老 年 用 药】 可以使用。

【药物相互作用】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】 本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【药理毒理】

药理：

人干扰素α2b具有广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用。其抗病毒作用主要是通过与靶细胞表面干扰素受体相结合，诱导细胞内2'-5A合成酶、蛋白激酶等抗病毒蛋白，阻止病毒蛋白质的合成、抑制病毒核酸的复制和转录而实现。干扰素具有多重免疫调节作用，可增强巨噬细胞的吞噬作用、增强淋巴细胞对靶细胞的特异性细胞毒性以及增强天然杀伤细胞的功能等，促进机体的免疫监视、免疫防护和免疫自稳功能。

本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审（文）第250705-33056号

【药品上市许可持有人】 【生产企业】 上海华新生物高技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 电话：021-60571066



毒理：

1. 急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。

2. 长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】 本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】 避光，干燥，于2-8°C保存和运输。

【包装】 每粒胶囊使用聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜封装。4粒/盒，每盒内有给药指套。

【有效期】 18个月

【执行标准】 YBS01312021

【批准文号】 国药准字S20050075

